

Smertestillende:

Hvis der kan være behov for smertestillende, vil Pamol /Panodil efter vægt er velegnet.



PIA JUUL SKOV

LOTTE JUNG JOHANSEN

ØRELÆGERNE FISKETORVET

FISKETORVET 4-6 5.SAL

5000 ODENSE C

KONSULTATION MELLEM 8.30-15.00

TIDSBESTILLING : 66140166

Man-torsdag kl. 8-10 samt 13-14

Fredag kl. 8-10

ELLER : www.orelaegernefisketorvet.dk

ØRELÆGERNE

FISKETORVET

F J E R N E L S E

A F

P O L Y P P E R

O p e r a t i o n s d a g

_ _ _ d a g d _ _ / _ _

k l . _ _ _

FJERNELSE AF POLYPPER (ADENOIDEKTOMI)

Adenoidektomi betyder fjernelse af de adenoide vegetationer eller "polypper", der sidder i næsesvælget oppe bag den bløde gane. Operationen kommer på tale ved gentagne langvarige mellemøreproblemer eller vedvarende besvær/ophævet vejrtrækning gennem næsen. Polypperne fjernes ved udskrabning gennem munden. Indgrebet foregår under fuld bedøvelse.

Før operationen:

Ved feber og hoste kontakt klinikken.

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom ved operationen. Dvs. barnet må **spise**

indtil kl.....

Der må **drikkes vand/saft**

indtil kl.....

Den udleverede **Panodil stikpille** skal gives kl.....

Bolcher, tyggegummi og lign. er forbudt i fasteperioden.

Efter operationen:

Barnet vil blive observeret på klinikken, indtil hans/hendes tilstand er stabil.

Efter operationen kan drøblen føles mere fyldig end normalt (vandig hævelse), og tungen kan føles tykkere efter trykket fra mundspærren.

Når I kommer hjem må barnet drikke og spise kold blød kost. Dagen efter må barnet spise normalt.

Efter operationen skal barnet passes hjemme i mindst 1 døgn.

Der vil sjældent efter det første døgn være behov for smertestillende.

VIGTIGT:

Der kan komme lidt brunligt sekret fra næsen de første dage.

I tilfælde af blødning fra næse og mund, der ikke stopper på is skal du ringe **112**.

Se evt. Finn skal bedøves på Sundhed.dk

