

Fjernelse af polypper

Adenoidektomi betyder fjernelse af de adenoide vegetationer eller "polypper", der sidder i næsesvælget oppe bag den bløde gane. Operationen kommer på tale ved gentagne langvarige mellemøreproblemer eller vedvarende besværet/ophævet vejrtrækning gennem næsen. Polypperne fjernes ved udskrabning gennem munden. Indgrebet foregår under fuld bedøvelse.

Før operationen:

OBS: VED HOSTE OG FEBER KONTAKT KLINIKKEN.

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom ved operationen. Dvs. barnet må spise som aftalt ved for undersøgelse på klinikken.

Se regler for faste under det pkt. på hjemmesiden.

Se film om bedøvelse på www.HCAND.dk

Bolcher, tyggegummi og lign. er forbudt i fasteperioden.

Hvis der er udleveret Panodil stikpille skal gives den 1 time før operationen.

Efter operationen:

Barnet vil blive observeret på klinikken, indtil hans/hendes tilstand er stabil.

Efter operationen kan drøblen føles mere fyldig end normalt (vandig hævelse), og tungen kan føles tykkere efter trykket fra mundspærren.

Senere på dagen ringer ørelægen og hører til patienten.

Når I kommer hjem må barnet drikke og spise kold, blød kost. Dagen efter må barnet spise normalt.

Efter operationen skal barnet passes hjemme i mindst 1 døgn.

Der vil sjældent efter det første døgn være behov for smertestillende.

Husk kontrol efter 8 uger.

VIGTIGT:

I tilfælde af blødning der ikke stopper på is skal du ringe **112**.